

宝安区2018-2019学年第一学期期末调研测试卷

高二 数学 (理科)

2019.1

- 说明：1. 全卷共三道大题，满分 150 分，考试时间 120 分钟。
2. 答题前，请检查试卷和答题卡是否完整无破损；然后将考生信息用规定的笔
 填涂在答题卡的指定位置。
3. 答题时将答案写在答题卷的指定位置；不得使用涂改液。
4. 保持答题卡的整洁，考试结束后，只上交答题卡。

一、选择题（本大题共 10 个小题，每小题 5 分，共 50 分。在每小题给出的四个选项
 中，只有一项是符合题目要求的。）

1. 下列说法正确的是（ ）

- A. “ $\forall x, y \in R$, 若 $x+y \neq 0$, 则 $x \neq 1$ 且 $y \neq -1$ ” 是真命题
B. 在同一坐标系中，函数 $y = f(1+x)$ 与 $y = f(1-x)$ 的图象关于 y 轴对称
C. 命题“ $\exists x \in R$, 使得 $x^2 + 2x + 3 < 0$ ” 的否定是“ $\forall x \in R$, 都有 $x^2 + 2x + 3 > 0$ ”
D. $a \in R$, “ $\frac{1}{a} < 1$ ” 是“ $a > 1$ ” 的充分不必要条件

2. 已知双曲线 $C_1: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 与双曲线 $C_2: \frac{x^2}{2} - y^2 = -1$, 给出下列说法，其中错
误的是（ ）

- A. 它们的焦距相等 B. 它们的焦点在同一个圆上
C. 它们的渐近线方程相同 D. 它们的离心率相等

3. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，“ a_4, a_{12} 是方程 $x^2 + 3x + 1 = 0$ 的两根”是“ $a_8 = \pm 1$ ”的（ ）

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

4. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle C = \frac{\pi}{3}$, $BC = a$, $AC = b$, 且 a , b 是方程 $x^2 - 13x + 40 = 0$
的两根，则 AB 的长度为（ ）

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 7



5. 在 R 上定义运算 $a \otimes b = (a+1)b$, 若存在 $x \in [1, 2]$, 使不等式 $(m-x) \otimes (m+x) < 4$

成立, 则实数 m 的取值范围为()

- A. $(-3, 2)$ B. $(-1, 2)$ C. $(-2, 2)$ D. $(1, 2)$

6. 已知直线 $ax+by+c-1=0$ ($b, c > 0$) 经过圆 $x^2+y^2-2y-5=0$ 的圆心, 则

$\frac{4}{b} + \frac{1}{c}$ 的最小值是()

- A. 9 B. 8 C. 4 D. 2

7. A, B, C 是 $\triangle ABC$ 的内角, 其中 $B = \frac{2\pi}{3}$, 则 $\sin A + \sin C$ 的取值范围()

- A. $(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1)$ B. $(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$
C. $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ D. $(\frac{\sqrt{3}}{2}, 2)$

8. 已知 $A(1, 0, 0)$, $B(0, -1, 1)$, $\overrightarrow{OA} + \lambda \overrightarrow{OB}$ 与 \overrightarrow{OB} 的夹角为 120° , 则 λ 的值为()

- A. $\pm \frac{\sqrt{6}}{6}$ B. $\frac{\sqrt{6}}{6}$ C. $-\frac{\sqrt{6}}{6}$ D. $\pm \sqrt{6}$

9. 已知两圆 C_1 : $(x-4)^2+y^2=169$, C_2 : $(x+4)^2+y^2=9$, 动圆在圆 C_1 内部且

和圆 C_1 相内切, 和圆 C_2 相外切, 则动圆圆心 M 的轨迹方程为()

- A. $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{48} = 1$ B. $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1$
C. $\frac{x^2}{48} - \frac{y^2}{64} = 1$ D. $\frac{x^2}{48} + \frac{y^2}{64} = 1$

10. 我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题: “远望巍巍塔七层, 红光点点倍加

增, 共灯三百八十一, 请问尖头几盏灯?”意思是: 一座7层塔共挂了381盏灯,

且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍, 则塔的顶层共有灯()

- A. 1 盏 B. 3 盏 C. 5 盏 D. 9 盏




二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分,请把答案写在答题卡相应位置上。)

11. 《孙子算经》是我国古代的数学名著,书中有关于这样问题:“今有五等诸侯,共分橘子六十颗,人别加三颗。问:五人各得几何?”其意思为“有5个人分60个橘子,他们分得的橘子数成公差为3的等差数列,问5人各得多少橘子。”这个问题中,得到橘子最少的人所得的橘子个数是_____。

12. 如图,测量河对岸的塔高 AB 时,可以选与塔底 B 在同一水平面内的两个测点 C 与 D 。现测得 $\angle BCD = 75^\circ$,

$\angle BDC = 45^\circ$, $CD = 50\sqrt{2}$ 米,并在点 C 测得塔顶 A 的仰角为 30° ,则塔高 $AB =$ _____米。



13. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \begin{cases} \frac{1}{n(n+2)} & n \text{为奇数} \\ n-7 & n \text{为偶数} \end{cases}$,则数列 $\{a_n\}$ 前15项和为 S_{15} 的值为_____。

14. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 焦点的直线交抛物线于 A 、 B 两点,若 $|AB| = 10$,则 AB 的中点 P 到 y 轴的距离等于_____。

三、解答题(本大题共6小题,共80分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。)

15. (本题12分)已知实数 x , y 满足 $\begin{cases} x-y+1 \geq 0 \\ x+y-5 \leq 0 \\ x+5y-5 \geq 0 \end{cases}$,记点 (x,y) 所对应的平面区域为 D 。


(1) 在平面直角坐标系 xOy 中画出区域 D

(用阴影部分标出),并求区域 D 的面

积 S ;

(2) 试判断点 $(4, \frac{3}{5})$ 是否在区域 D 内,并

说明理由。



16. (本题12分) 已知函数 $f(x) = x^2 + ax - b$ ($a, b \in \mathbb{R}$).

- (1) 若 $b = -1$, 且函数 $f(x)$ 有零点, 求实数 a 的取值范围;
- (2) 当 $b = 1 - a$ 时, 解关于 x 的不等式 $f(x) \leq 0$;

(3) 若正数 a, b 满足 $a + \frac{4}{b} \leq 3$, 且对于任意的 $x \in [1, +\infty)$, $f(x) \geq 0$ 恒成立,
求实数 a, b 的值.

17. (本题 14 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\triangle ABC$ 的面积


为 $\frac{a^2}{3 \sin A}$.

- (1) 求 $\sin B \sin C$;
- (2) 若 $6 \cos B \cos C = 1$, $a = 3$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

18. (本题 14 分) 已知各项都是正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_n = a_n^2 + \frac{1}{2}a_n$,
 $n \in \mathbb{N}^*$.

- (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 设数列 $\{b_n\}$ 满足: $b_1 = 1, b_n - b_{n-1} = 2a_n$ ($n \geq 2$), 数列 $\{\frac{1}{b_n}\}$ 的前 n 项和 T_n ,
求证: $T_n < 2$;
- (3) 若 $T_n \leq \lambda(n+4)$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 恒成立, 求 λ 的取值范围.

19. (本题 14 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中,
平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, $PA \perp BC$, E 是棱
 PC 的中点, $\angle DAB = 90^\circ$, $AB // CD$,
 $AD = CD = 2AB = 2$.



- (1) 求证: $PA \perp$ 平面 $ABCD$;
- (2) 若二面角 $E-BD-P$ 大于 60° , 求四棱锥 $P-ABCD$ 体积的取值范围.

20. (本题 14 分) 已知椭圆 C : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且过点
 $A(2, 1)$. 若 P, Q 是椭圆 C 上的两个动点, 且使 $\angle PAQ$ 的角平分线总垂直于 x 轴,
试判断直线 PQ 的斜率是否为定值? 若是, 求出该值; 若不是, 请说明理由.

