

数 学 试 卷(理科)

2019.1

考生注意：

1. 本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分。满分 150 分, 考试时间 120 分钟。
2. 考生作答时, 请将答案答在答题卡上。第 I 卷每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑; 第 II 卷请用直径 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答, 超出答题区域书写的答案无效, 在试题卷、草稿纸上作答无效。
3. 本卷命题范围: 集合, 逻辑, 函数, 导数, 三角函数与解三角形, 平面向量, 复数, 数列, 基本不等式, 线性规划, 立体几何, 解析几何, 算法, 统计与统计案例, 计数原理与二项式定理。

第 I 卷(选择题 共 60 分)


一、选择题: 本大题共 12 小题, 每小题 5 分, 共 60 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合 $A = \{x | x^2 - 3x + 2 \leq 0\}$, 集合 $B = \{x | 2^{x+1} \geq 1\}$, 则 $A \cup B =$
A. $(-\infty, 2)$ B. $[-1, +\infty)$ C. $[-1, 2]$ D. $[1, 2]$
2. 复数 $z = \frac{2+i}{1-i}$ 在复平面内对应的点位于
A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限
3. 已知 $\mathbf{a} = (4, 2)$, $\mathbf{b} = (1, -2)$, 则 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| =$
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
4. 要得到函数 $y = \cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$ 的图象, 只需将函数 $y = \cos 3x$ 的图象
A. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位 B. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位
C. 向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位 D. 向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位
5. 已知变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y+1 \geq 0 \\ 2x-y+2 \geq 0 \\ 2x+y-2 \leq 0 \end{cases}$, 则目标函数 $z = 3x - y$ 的最大值为
A. -3 B. -2 C. 13 D. 16

6. 执行如图程序框图,则输出 k 的值为

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

7. 抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F , 准线为 l , 过点 F 的直线与抛物线



交于 A, B 两点, 过 A 作 l 的垂线, 垂足为 H , 若 $\triangle AFH$ 是面积为 $4\sqrt{3}$ 的正三角形, 则 $|BF| =$

- A. $\frac{5}{4}$
- B. $\frac{4}{3}$
- C. $\frac{5}{3}$
- D. $\frac{3}{2}$

8. 若 $a>0, b>0, a+2b=3$, 则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{2b}$ 的最小值为

- A. $\frac{4}{3}$
- B. $\frac{8}{3}$
- C. 2
- D. 3

9. 设 O 为坐标原点, M 为圆 $(x-3)^2+(y-1)^2=2$ 的圆心, 且圆上有一点 $C(x_0, y_0)$ 满足 $\overrightarrow{OC} \cdot$


$$\overrightarrow{CM}=0, \text{ 则 } \frac{y_0}{x_0} =$$

- A. 1 或 -7
- B. -1 或 7
- C. 1 或 $-\frac{1}{7}$
- D. $\frac{1}{7}$ 或 -1

10. 某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积为

- A. $\frac{5\pi}{3}$
- B. $\frac{4\pi}{3}$
- C. 2π
- D. 3π

11. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0, b>0)$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 过点 $(0, -\sqrt{2})$ 及



双曲线的右顶点的直线与双曲线的一条渐近线平行, 则双曲线的方程为

- A. $x^2-\frac{y^2}{3}=1$
- B. $\frac{x^2}{3}-y^2=1$
- C. $x^2-\frac{y^2}{2}=1$
- D. $\frac{x^2}{2}-y^2=1$

12. 已知正项数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $4S_n=a_n^2+2a_n, n \in \mathbb{N}^*$, 若 $b_n=(n+1)(\sqrt{2})^{a_n}$, 则数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n 为

- A. $T_n=n \cdot 2^{n+1}$
- B. $T_n=(n+1) \cdot 2^n$
- C. $T_n=2^{n+2}-n$
- D. $T_n=n \cdot 2^{n+2}-2$


第Ⅱ卷(非选择题 共 90 分)

二、填空题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分.

13. 已知 $\frac{\sin \theta}{2\sin \theta - \cos \theta} = 1$, 则 $\tan \theta = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. $(1+x)(1-2x)^5$ 展开式中, x^3 的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

15. 如图所示,将直角三角形 ABC 以斜边 AB 上的高 CD 为棱折成一个三棱锥 C-ADB₁,且使得平面 ACD ⊥ 平面 B₁CD,记 BC=3,AC=4,则直线 AB₁ 与平面 ACD 所成角的正切值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.




16. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -|x| + 3, & x < 1 \\ x^2 - 4x + 5, & x \geq 1 \end{cases}$, $g(x) = \ln(x+a)$ ($a \in \mathbb{R}$),若函数 $y = f(x) - g(x)$ 恰有 4 个零点,则实数 a 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题:本大题共 6 小题,共 70 分. 解答应写出必要的文字说明、证明过程及演算步骤.

17.(本小题满分 10 分)

某数学老师,在甲、乙两个平行班级采用两种不同的教学方法进行教学实验.为了比较教学效果,期中考试后,分别从两个班级中各随机抽取 20 名学生的成绩进行统计,记成绩不低于 120 分者为“成绩优良”,并分别绘制出频率分布直方图如图.



(1)由以上频率分布直方图数据填写下面 2×2 列联表,并用分层抽样方法在上述 40 人中,按成绩是否优良抽出 8 人,求抽出的 8 人中成绩优良的人数.

	甲班	乙班	总计
成绩优良			
成绩不优良			
总计			

(2)判断能否在犯错概率不超过 0.025 的前提下认为“成绩优良与教学方式相关”?

附: $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+c)(b+d)(a+b)(c+d)}$. ($n=a+b+c+d$)

临界值表

$P(K^2 \geq k_0)$	0.10	0.05	0.025	0.010
k_0	2.706	3.841	5.024	6.635

18.(本小题满分 12 分)

在 $\triangle ABC$ 中,内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ,已知 $\cos A \cos B - \sin A \sin B = 1 - \sqrt{3} \sin C$.

(1)求角 C 的大小;

(2)若 $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{3}$, $c=2\sqrt{3}$,求 $a+b$ 的值.

19.(本小题满分 12 分)

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 满足 $S_n = \frac{4}{3}a_n - \frac{1}{3}a_1$,且 $a_2 + 18$ 是 a_1, a_3 的等差中项.

(1)求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2)记数列 $b_n = \sqrt{a_n} + 1$ 的前 n 项和为 T_n ,求使得 $T_n < 1032$ 成立的最大的正整数 n 的值.


20.(本小题满分 12 分)

如图,在各棱长均为 2 的三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中,侧面 A_1ACC_1

\perp 底面 ABC ,且 $\angle A_1AC = \frac{\pi}{3}$,点 O 为 AC 的中点.

(1)求证:平面 $ABC \perp$ 平面 A_1OB ;

(2)求二面角 B_1-AC-B 的大小.



21.(本小题满分 12 分)

已知椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$,若在 $(2, 0), (-\sqrt{2}, \sqrt{3}), \left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \left(\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 四个点中

有 3 个在 M 上.

(1)求椭圆 M 的方程;

(2)若点 A 与点 B 是椭圆 M 上关于原点对称的两个点,且 $C(-4, 0)$,求 $\vec{CA} \cdot \vec{CB}$ 的取值范围.

22.(本小题满分 12 分)

已知函数 $f(x) = x^3 - 2ex^2 + ax$.

(1)当 $a=4e$ 时,求曲线 $f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2)若函数 $g(x) = x^3 - 2ex^2 + ax - \ln x$ 只有一个零点,求实数 a 的值.